



Nachweiszeiten

NSAID

Phenylbutazone		po iv	(4,4mg/kg bid)	7 Tage
Flunixin		po iv	(1mg/kg sid)	7 Tage
Ketoprofen	Ketofen	iv	(2,2mg/kg sid)	4 Tage
Meloxicam	Metacam	po iv	(0,6mg/kg sid)	3 Tage
Firocoxib	Equioxx	po iv	(57mg sid)	7 Tage
Diclofenac	Surpass	local		7 Tage
Meclofenamate	Apirel	po	(2,5mg bid)	7 bis 12 Tage
Metamizol	Vetalgin	iv	(30 mg/kg sid)	3 Tage
Metamizol + N-Butylsc.	Buscopan	comp		3 Tage
N-Butyl Scopolamine	Buscopan	iv	(0,3mg/kg sid)	1 Tag

SEDATIVA

Detomidine		iv	(0,2mg/kg)	2 (bis 3) Tage
Xylazine		iv	(150 mg sid)	3 Tage
Romifidine	Sedivet	iv	(10 mg sid)	5 Tage
Acepromazin	Vetranquill	po im	(1,8-3,5mg/kg)	5 Tage

KORTIKOSTEROIDE

Dexamethason- Isonicotinat	Voren susp	iv	(2ml/100kg sid)	über 20 Tage
Dexamethason- Isonicotinat	Voren Depot	im	(2ml/100kg sid)	über 38 Tage
Dexamethason- Phosphat		iv	(10 mg sid)	2 Tage
Methylprednisolon- Acetate	Depot Medrol	ia	(100mg sid) (200mg sid)	14 Tage 28 Tage
Triamcinolone- Acetonid	Kenakort	ia	(40 mg/ml sid)	7 (bis21) Tage
Flumethasone	Flukort	iv im ia	(5mg sid)	4 Tage
Betamethasone		ia	(30 mg sid)	7 Tage
Isoflupredone-Acetat	Predef	im ia	(20 mg sid)	14 Tage

LOKALANAESTHETIKA

Mepivacaine		s.c.	(40 mg sid)	2 Tage
Lidocaine		s.c.	(bis 300mg sid)	2 Tage

ATEMWEGE

DembrexineSputolysine		po	(0,9mg/kg bid)	5 Tage
Clenbuterol	Ventipulmin	po	(0.8mug/kg bid)	7 Tage FEI 14 Tage (BRD)
Clenb. + Demb.	Ventiplus	po	über 10 Tage	14 Tage

VARIA

Pitchers' Plant	Sarapin	im iv		1 Tag
Pergolide	Permax	po		1 Tag
Isoxuprin		po	30 Tage (500mg bid)	7 Tage
Pentoxiphylline		po	6 Wochen (4 g bid)	7 Tage
Methocarbamol		po	2 Wochen (5 g bid)	5 Tage
DMSO		iv	5 Tage (1g/kg bid)	5 Tage



OPHTHALMIKA

Tropicamid lokal	lokal	2 Tage
Cyclosporin Tropfen und Implantate	lokal	erlaubt
Voltaren Augentropfen	lokal	3 Tage

Burtorphanol (Morphasol und ähnliche, 4 mg/ml) i.v bis 5 ml gemäss unbestätigten Laborangaben (Rennpferdeuntersuchungen) ca. 3 Tage.

Diese Liste stellt eine Zusammenstellung von Nachweiszeiten für häufig gebrauchte Medikamente für die SVPS Tierärzte dar. Diese Liste kann als Hilfsmittel verwendet werden, wenn ein Entscheid über eine Starterlaubnis mit Medikationserklärung erteilt werden muss. Auf keinen Fall darf sie als verbindliche Liste für Nachweiszeiten angesehen werden, weil die Pharmakokinetik für die verschiedenen Pferde auch unterschiedlich ist und auch beim selben Pferde je nach Allgemeinzustand und Trainingsintensität variieren kann.

Die Veterinärkommission des SVPS lehnt jede Haftung und Verbindlichkeit im Zusammenhang mit dieser Liste ab.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat strengere (=längere) Fristen (Clenbuterol 21 Tage, Triamcinolone ia 56 Tage).

Studien haben gezeigt, dass bei gewissen Substanzen (Dipyron, Flunixin, Clenbuterol) eine Kontamination der Einstreu mit Ausscheidungsprodukten (vor allem aus dem Harn) zur Wiederaufnahme von Substanzen führen kann, was zu längeren Nachweiszeiten führen könnte. Es ist deshalb sehr wichtig, dass die Boxen von Sportpferden, welche behandelt werden, sehr sorgfältig und täglich gereinigt werden. Dies gilt vor allem bei oraler Verabreichung und Stroheinstreu.