



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27 CH-8555 Müllheim
Telefon 052 630 50 50 Fax 052 630 50 40
www.tezetag.ch info@tezetag.ch

Impfplan für Schweine

Grundsätze

1. Nur gesunde Tiere impfen
2. Am besten für jeden Impfstoff eine separate Spritze gebrauchen
3. Spritzen nur mit heissem Wasser waschen, NICHT mit Alkohol, Desinfektionsmitteln oder Seife

Rotlauf und Parvovirose (Porcilis Ery und Parvo)

2ml hinter einem Ohr in den Muskel

Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten

- 2x im Abstand von 4 Wochen vor dem Decken (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Decken).

Grundimmunisierung von Sauen

- 2x im Abstand von 4 Wochen in der Säugezeit

Wiederholungsimpfungen

- Eine Woche vor, oder beim Absetzen der Ferkel

Coli-Durchfall (Porcilis porcoli, ColiClos)

Porcilis porcoli und ColiClos 2ml hinter einem Ohr in den Muskel

Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten / Sauen

- 2x im Abstand von 3-4 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 4 Wochen vor dem Abferkeln).

Wiederholungsimpfungen

- 4 Wochen vor dem Abferkeln

HPS = Glässer (Haemophilus parasuis)

Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten / Sauen

4 ml stallspezifische Vakzine oder 2ml Porcilis Glässer hinter einem Ohr in die Muskulatur

- 2x im Abstand von 3-6 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Abferkeln). z.B. zwischen 40. - 50. und 80. - 90. Trächtigkeitstag



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27 CH-8555 Müllheim
Telefon 052 630 50 50 Fax 052 630 50 40
www.tezetag.ch info@tezetag.ch

Wiederholungsimpfungen

- 3 bis 4 Wochen vor dem Abferkeln
(Diese Impfung wird bei Krankheitszeichen von Ferkel, Remonten und Muttersauen angewendet. Eine Teilwirkung bleibt bei den Ferkel geimpfter Muttersauen bis zum Gewicht um 25 kg bestehen. Bei starkem Erregerdruck müssen die Ferkel/Jäger geimpft werden.)

Grundimmunisierung von *Ferkeln*

2 ml hinter einem Ohr

- 2x im Abstand von 3 Wochen (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Einstellen zur Mast). Tiere jünger als 5 Wochen nicht impfen.

Clostridien-Durchfall (ColiClos Mutterschutzimpfung)

Grundimmunisierung von *Jungsauen / Remonten / Sauen*

2ml hinter einem Ohr in die Muskulatur

- 2x im Abstand von 4 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 4 Wochen vor dem Abferkeln). Z.B. zwischen 40. - 50. und 80. - 90. Trächtigkeitstag

Wiederholungsimpfungen:

- spätestens 4 Wochen vor dem Abferkeln

Lawsonien-Durchfall (Enterisol Ileitis)

Impfung von Ferkeln ab einem Alter von 3 Wochen, aber vor dem Absetzen, 2ml einmalig eingeben, Tiere dürfen 3 Tage vor und 3 Tage nach der Behandlung kein Antibiotikum erhalten.

Impfstoff anmischen (Lebendimpfstoff), Transfernadel zuerst in weisse Plastikflasche, dann in braune Glasflasche stechen. Impfstoff ist nur für 4 Std stabil. Eingabe mit Drench/Dosierpistole, Eingabegeräte dürfen nicht mit Desinfektionsmittel oder Seifen gereinigt werden.

Circovirose Ferkelimpfung (Circoflex/Porcilis PCV)

1ml/2ml zwischen dem 14. und 21. Lebenstag, hinter einem Ohr in die Muskulatur. Impfschutz hält bis in die 20. Lebenswoche an.

Wird Impfstoff bei Ferkelimpfung nicht vollständig aufgebraucht, so wird empfohlen mit dem Restimpfstoff die Jungsauen nachzuimpfen