



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27 CH-8555 Müllheim  
Telefon 052 630 50 50 Fax 052 630 50 40  
www.tezetag.ch info@tezetag.ch

## Impfplan für Schweine

### Grundsätze

1. Nur gesunde Tiere impfen
2. Am besten für jeden Impfstoff eine separate Spritze gebrauchen
3. Spritzen nur mit heissem Wasser waschen, NICHT mit Alkohol, Desinfektionsmitteln oder Seife

### Rotlauf und Parvovirose (Porcilis Ery und Parvo)

2ml hinter einem Ohr in den Muskel

#### Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten

- 2x im Abstand von 3-6 Wochen vor dem Decken (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Decken).

#### Grundimmunisierung von Sauen

- 2x im Abstand von 3-6 Wochen in der Säugezeit

#### Wiederholungsimpfungen

- Eine Woche vor, oder beim Absetzen der Ferkel

### Coli-Durchfall (Porcilis porcoli, ColiClos)

Porcilis porcoli und ColiClos 2ml hinter einem Ohr in den Muskel

#### Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten / Sauen

- 2x im Abstand von 3-6 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Abferkeln).

#### Wiederholungsimpfungen

- 3 bis 4 Wochen vor dem Abferkeln

### HPS = Glässer (Haemophilus parasuis)

#### Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten / Sauen

4 ml stallspezifische Vakzine oder 2ml Porcilis Glässer hinter einem Ohr in die Muskulatur

- 2x im Abstand von 3-6 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Abferkeln). z.B. zwischen 40. - 50. und 80. - 90. Trächtigkeitstag



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27 CH-8555 Müllheim  
Telefon 052 630 50 50 Fax 052 630 50 40  
www.tezetag.ch info@tezetag.ch

### Wiederholungsimpfungen

- 3 bis 4 Wochen vor dem Abferkeln  
(Diese Impfung wird bei Krankheitszeichen von Ferkel, Remonten und Muttersauen angewendet. Eine Teilwirkung bleibt bei den Ferkel geimpfter Muttersauen bis zum Gewicht um 25 kg bestehen. Bei starkem Erregerdruck müssen die Ferkel/Jäger geimpft werden.)

### Grundimmunisierung von Ferkeln

1 ml hinter einem Ohr

- 2x im Abstand von 3 Wochen ( 2. Impfung mindestens 2 Wochen vor dem Einstellen zur Mast). Tiere jünger als 3 Wochen nicht impfen.

### **Clostridien-Durchfall (ColiClos Mutterschutzimpfung)**

#### Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten / Sauen

2ml hinter einem Ohr in die Muskulatur

- 2x im Abstand von 4 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Abferkeln). Z.B. zwischen 40. - 50. und 80. - 90. Trächtigkeitstag

#### Wiederholungsimpfungen:

- spätestens 3 Wochen vor dem Abferkeln

### **Lawsonien-Durchfall (Enterisol Ileitis)**

Impfung von Ferkeln ab einem Alter von 3 Wochen, aber vor dem Absetzen, 2ml einmalig eingeben, Tiere dürfen 3 Tage vor und 3 Tage nach der Behandlung kein Antibiotikum erhalten.

Impfstoff anmischen (Lebendimpfstoff), Transferrnadel zuerst in weisse Plastikflasche, dann in braune Glasflasche stechen. Impfstoff ist nur für 4 Std stabil. Eingabe mit Drench/Dosierpistole, Eingabegeräte dürfen nicht mit Desinfektionsmittel oder Seifen gereinigt werden.

### **Circovirose Ferkelimpfung (Circoflex/Porcilis PCV)**

1ml/2ml zwischen dem 14. und 21. Lebenstag, hinter einem Ohr in die Muskulatur. Impfschutz hält bis in die 20. Lebenswoche an.

**Wird Impfstoff bei Ferkelimpfung nicht vollständig aufgebraucht, wo wird empfohlen mit dem Restimpfstoff die Jungsauen nachzuimpfen**