



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27, CH-8555 Müllheim  
Telefon 052 630 50 50 Fax 052 630 50 40  
www.tezetag.ch info@tezetag.ch

## Diätplan bei Magen-Darm-Störungen

### Vorgehen

- ☞ viel Flüssigkeit (Wasser, Tee, WHO-Juice (siehe unten), isotonische Lösungen wie Gatorade, Isostar etc.)
- ☞ bei erhaltenem Appetit: Leichtverdauliche Nahrung („Energie für den Darm“) in Form von Reisschleim (siehe unten) oder Diätfutter (z.B. Hill's i/d), alle 3-4 Stunden eine kleine Portion
- ☞ bei fehlendem Appetit: Ein Tag fasten. Siehe auch unten „Rücksprache mit Tierarzt“
- ☞ bei Besserung langsam über 2-3 Tage Futtermenge erhöhen, gewohntes Futter beimischen und die Anzahl Mahlzeiten reduzieren.
- ☞ Wenn möglich Futterzusätze anwenden wie Probiotica (Synbiotic, Benebac, Fortiflora), allgemeine Durchfallmittel auf pflanzlich-mineralischer Basis (Promax, Canikur), pflanzliche Mittel wie Johannisbrot, Kamille, Fenchel, Eichenrindenpulver. Lassen Sie sich von uns beraten, welche Mittel sich jeweils für ihr Tier eignen.

### Rücksprache mit Tierarzt/-ärztin wenn:

- Erbrechen innert 4 Stunden nach Anwendung eines Medikamentes gegen Erbrechen (Primperan, Paspertin, Cerenia etc.)
- Blutiges Erbrechen
- Blutiger Durchfall
- Komplette Futterverweigerung auch noch nach 24h
- Starke Bauchschmerzen (gespannter Bauch, aufgekrümmter Rücken, klammer Gang, Jammern, Unruhe)
- Fieber (Normaltemperatur bis 39.0)

### Rezept Reisschleim

Eine Risotto- oder Milchreisemarke verwenden, in viel magerer Bouillon oder leicht gesalzenem Wasser solange kochen, bis eine „schleimige“ Konsistenz erreicht wird („Löffel bleibt nicht stecken“). Um die Schmackhaftigkeit zu verbessern kann auch etwas mageres Fleisch (fein geschnitten oder Geschnetzeltes vom Huhn) mitgekocht werden (nicht roh!)

### Rezept WHO-Juice (Elektrolyt-Drink)

1 Liter Wasser + ½ Liter pasteurisierter Apfelsaft + 4 Teelöffel Honig + 2/3 Teelöffel Kochsalz + ½ Teelöffel Backpulver. Alles zusammen in einem Kochtopf aufkochen.